# 長壽

于右任

中華郵政特准掛號認為新聞紙類

每份四分 第九十八期

中華民國二十三年四月二十日

每逢星期五出版 全年五十期 連郵二元 國外加倍

館址上海三馬路雲南路口幸福書局內

㊂內政部登記證警字第一一二一七號◉

㊂本報特聘請吳之屏方家楨大律師為常年法律顧問◉

## ◘本期目錄

天花與種痘
談談探病針
安胎驗方
驗方五則
桔梗藥性之淺解
談談婦女懷孕之徵狀
吃花生中毒之淺解
婦女病要方選
寶貴的二張美容奇方
治血痢經驗良方
黃疸之病理及治療
腦膜炎之新舊研究
斜眼之原因
便秘的原因和治療
瘧疾自療法

## 天花與種痘

〔時症須知〕 龐敦敏

這個法子。在中國恐怕已經行了幾百年了。叫作吹苗。或叫鼻苗。俗稱大花。是那一位老前輩想出來的。却無從考據。他必定因為痘是免不了的。與其等那危險的天然痘子來傳染。不如選擇輕症的天花特為叫他傳染。可以輕一點。他的立意。不可以說不好。但是往往有因為種花。反而發很重的痘症。把性命送掉的。要說是萬安萬穩。實在不見得。所以反對排斥的人很多。如今行了牛痘。這鼻苗更沒有人相信了。什麼叫牛痘呢。因為這痘的種從牛來的。為什麼人要種牛的痘呢。因為牛也有痘症。他發的時候很輕很輕。僅不過乳傍有幾個青藍小泡。西曆一千七百六十八年。大約中國雍正年間。英國有一個醫生。名叫琴納。他很熱心研究怎樣可以免出天花的法子。把自己的兒子。當作試驗品。替他們種痘看是怎樣的變化結果。後來他偶然看見一個擠牛乳的女人。叫奈爾美司，手臂上長了二顆粒。是由牛身上傳染來的。却和天花的形狀一樣。他就把那女人痘泡中的漿。種在一個男孩子叫希伯士的身上。希伯士也出同樣的痘。後來又特為把天花的毒。(就是出天花人身上的漿)種在希伯士的身上。連種了二次。一點也沒有什麼。琴納先生熱心研究這件事。前後三十年。他的試驗。自然也不止一次。於是他發表他的報告。說是要免天花。只要種牛痘。這個當兒。一般的人。多以為人怎麼可以種起牛的痘來呢。真真荒謬絕倫。所以大家多不信他。反對他。甚至於拿這個來攻擊他。對於新事業抱異見。也是人情之常。然而真理到底戰勝。過了幾年。大家知道琴納先生的話不差。反對的。贊成了。攻擊的。投降了。



幸福書局出版醫藥新書
地址上海三馬路雲南路轉角

婦女病 全書二冊 實售一元 外埠函購寄費一角

求孕與避孕 全書二冊 實售一元 外埠函購寄費一角

腎病研究 全書二冊 實售一元 外埠函購寄費一角

百病秘方 全書一冊 實售四角 外埠函購寄費九分

保腦新書 全書一冊 實售四角 外埠函購寄費九分

胎產問題 全書一冊 實售四角 外埠函購寄費九分



## 吃花生中毒之淺解

〔藥物討論〕 【劉曉東】

前閱本報。金勤達君啖花生中毒。是屬奇聞。劉麗琳君。正誤非花生毒。乃半夏也。亦屬是理。但劉君附近處。兒童常中半夏毒。故知非奇異之花生。照吾鄙實之地。未聞有中此毒。真信為奇聞。恐他處亦罕聞之。若細解之。金所啖之花生。色白形圓。與半夏形色似屬相同。似信為半夏。觀報中所載。由金君剝出奇異之花生。顯係從殼中剝出。如無殼。即是半夏。無疑。若果從殼中剝出。半夏無殼。非半夏也。此必係毒蛇交感之毒。或毒蛇出穴口含之汁。吐遺荒僻之地。抑或砒霜等種之毒品。遺入土內。該花生偶生於此。含毒氣而生。結成此花生一粒。今金君誤啖之。故中毒。茲當詢食花生之金君。可否有殼。如無殼以生姜解之最妙。果有殼當以菉荳衣銀花粉甘草明雄黃人中黃之類解之為是。特具鄙見載入本報。還希明哲酌之。

## 婦女病要方選

〔婦科須知〕 朱振聲

### (一)調經要方

◘先期飲 當歸。白芍。生地。川芎。黃蘗。知母。茯苓。黃連。阿膠。艾葉。香附。炙草。

(按)此方治經水先期內熱重者。有涼血固經之妙。唯方中知蘗芩連。有疑為苦寒太過。不知血分熱重。胃強善飯者。服之不啻一服清涼散也。況有四物養血。而艾膠香附炙草都屬溫性。更可無妨。宜空腹時溫服效。

◘過期飲 當歸。白芍。熟地。香附。川芎。紅花。桃仁泥。蓬莪蒁。木通。炙甘草。肉桂。

(按)四物養血。炙草和中。香附行血中之氣。紅花桃仁莪朮木通行血去瘀。而尤妙在肉桂。溫通血氣。血得熱而行。無寒凝之患矣。君虛者。去破血藥為是。

◘固經丸 黃蘗。白芍。黃芩。龜板。樗根皮。香附子。

(按)經水過多不止。乃陰虛挾熱所致。法當補陰清熱。此方主之。乃丹溪之法。以肝腎為主。四物中只用一物。非尋常套方者所能知。

◘地骨皮飲 生地。川芎。當歸。白芍。地骨皮。粉丹皮。

(按)經行超前多由于熱。蓋由陰虛陽旺而然。此方清血熱之中。而有和陰補血之效。血得補而充。熱得寒而清。平肝而不傷胃。與知蘗之苦寒廻別。實良方也。

◘烏藥湯 烏藥。香附。當歸。木香。炙草。

(按)治氣瘀血海作痛。此方理氣行經。藥不多而效自見。

◘失笑散 五靈脂。蒲黃。

(按)治心腹絞痛欲死。或血迷心竅。不省人事。此方甘不傷脾。辛能祛瘀。製末用酒調服。更能溫通氣血。不覺諸證悉除。直可一笑置之矣。

◘溫經湯 當歸。白芍。桂枝。吳萸。川芎。生薑。半夏。丹皮。麥冬。人參。甘草。阿膠。

(按)此金匱婦科主要方也。治寒凝血滯。少腹作痛。及經脈不調。治有特效。胞中溫和。則能受孕。若風冷侵入。則經行而痛。此類婦人。每無生育。此方備溫補通行之效。用者多驗。若無熱去丹皮。

### (二)崩漏要方

◘獨參湯 人參

(按)此方於氣幾息。血將脫之證。速即濃煎頓服。能挽回性命於瞬息之間。非他物所可代也。良以有形之血。不能驟補。而無形之氣。所當急固。人參能補氣安神。故暴崩不止。氣隨血脫者。無不相宜。若病兼別因。則又當隨機應變。於獨參湯中。或加熟附。補陽而回厥逆。或加生地。涼陰而止吐衄。或加黃芪。固表之汗。或加當歸。救血之脫。或加姜汁。以除嘔吐。或加童便。以止陰煩。或加茯苓。令水化津生。治消渴泄瀉。或加黃連。折火逆衝上。治噤口毒痢。各隨見症之不同。而加減之。則其效更可相得而益彰矣。

臨症必讀

## 談談探病針（續）

（林良）

診病每日早晚用此針試探二次。大概晨早熱度較低。晚間略高。小兒老人較壯年熱度較高。飽飯後或行動時熱度較高。飢餓時或勞碌思慮過甚時熱度略低。因天氣之寒熱。房屋之冷暖。熱度亦略有高低之分。又大小便不通。能加熱度。便後能減熱度。然所差多不過二度。

### （四）普通病狀體溫略說

病狀未發見以前。用此針試驗。即能預知所有疾病。可稱未卜先知。且連試幾日。亦能辨明爲何症

（一）（感冒傷風症）其熱度升降。早晚加減。自始至終。皆有一定準則。絕無忽然變遷。驟加速減情形。

（二）（瘧疾或霍亂症）先一日毫無別故。本日試身熱。忽高至一百〇五六度（四十一二度）以上。次日又忽然減低。退成常溫。必是此病。始能變化如此之速。

（三）（內傷症）用此針試其身熱。即可知病的輕重。熱度愈高則病愈重。較常溫低二三度者。病亦危險

（四）（半身不遂風癱等症）身熱必左右高低不同。「夾用」

（五）（小兒身熱症）熱忽加高。不久能減低者。不可認爲有大病。

（六）（傷寒「即腸窒扶斯小腸壞熱」症）初起時。其身熱。每晚必加二度。每早必減二度。是每日必加二度。如是每日漸加。若加過一百〇五度（四十度）病即危險。倘晨早加至一百〇六度五六分（四十度〇四五分）即必死。若身熱每日漸加。忽一日較常溫反低二三度。即爲小腸潰爛穿孔。肛門將瀉血之徵。隔時必至瀉血。病已危殆。雖瀉血輕微者。間能治愈。然多是死症。若此症回頭。身熱退時。亦每日逐漸減退

（七）（斑疹傷寒症「又名發斑瘟疫發疹窒扶斯」）。初起時。身熱有加無減。至第四五日晚間。即升至一百〇四五度。（三十九度半至四十度）或較此更高。後至第七日晨早。即略減。以後仍加。但不如前加之甚。至病退時。大約每早減去二度。至全愈時。熱度能速降。約十二點至四十八點即退至常溫。（未完）

診驗心得

## 安胎驗方

（敖知白）

（病狀）懷孕在五六月間。嘔吐異常。不思飲食。四肢無力。腹部脹痛。

（治療）理血健脾清熱。

（主方）當歸五錢。熟地六錢。白芍三錢。川芎錢半。白朮五錢。黃芩二錢。附註。方內之白朮黃芩。可因患者寒熱虛實而增減。

（治驗）鄰婦某。素患小產。每孕五六月間。上症畢現。前醫每投以保產無憂散。或其他養胎方。而前症轉劇。後余敎伊服此方三劑。諸症若失。月滿遂產一男。以後凡孕婦患上症者。投之輒効。百不失一。眞良方也。

## □驗方五則

李健頤

（一）治血淋驗方

用大黃三錢。川連一錢。冰片五厘。研末同雞蛋白二枚。調食即愈。

（二）打傷瘀血攻心方

打傷瘀血攻心。人事不知者。急宜用麝香熊胆。硃砂血竭山羊血川連三七地龍各五分。煎湯調酒服最效。

（三）治經閉驗方

馬鞭草冰糖等分。煎酒服即行。

（四）洗目痛方

白菊花一錢。荊芥一錢。胆礬八分。皮硝八分。防風一錢。薄荷一錢。共煎湯。用消毒藥棉洗之。

（五）禿瘡藥方

蛇床子四分。生石膏四分。生大黃四分。枯凡四分。五倍子四分。松香四分。銅青四分。黃柏末四分。硫磺二分。共研細末。調茶油。塗於患處。

## 朱振聲醫士

上海新新公司常年醫藥顧問
上海世界書局常年醫藥顧問

### 診例

（甲）門診一元 號金不取
（乙）出診四元 路遠遞加
（丙）膏丸方四元 隔日取件
（丁）外埠問病二元 原班回件
（戊）急病隨請隨到

時間：門診上午九時至下午四時止 出診四時以後

診所：上海雲南路會樂里第一弄第一家

電話：九一四九二

掛號處啓



用藥指南

## 桔梗藥性之淺解

（朱振聲）

六十四（味苦辛平入太陰肺）

□清肺熱以除癰痿 風傷皮毛。熱傷血脈。風熱相搏。氣血稽留。鬱結於肺。則成肺癰。多唾涎沫。而無膿血者。肺痿也。桔梗味苦入肺。故能清熱。辛能去風。風去熱退。肺金有權矣。

□通鼻塞而理咽喉 風邪入肺。鼻塞不利。或傳於喉。腫於兩旁者。謂之喉痺。桔梗苦辛。能散風邪。風火退則喉痺愈。如喉痺帶形寒。不可用鮮青果。因其性濇故也。

□排膿行血 氣血不足。則膿不得出。桔梗味辛入肺。能行氣行血。氣血流利。則膿血排矣。

□下氣消痰 桔梗味辛性平能升。味苦又能泄也。所謂升者。升肺中之清氣也。降者。降肺中之濁氣也。

□定痢疾腹痛 痢疾由於濕熱鬱於腸胃。氣機不利。故腹疼痛。桔梗專入肺經。辛能調氣。味苦能除濕熱。故可治之。

□止胸脇煩疼 肝氣鬱則胸膈不舒。邪入少陽。則胆火薰心。故而煩疼。桔梗入於肺經。味辛平。金能尅木。苦能下火。故止胸脇煩疼。

胎產須知

## 談談婦女懷孕之徵狀

（朱鄭榮）

（一）觸診子宮 女子有胎後五六個月。用觸診子宮法。可以證明胞漿裏面有胎之存在。診察的法子。令婦人直立。以一手之指探入陰道。直到子宮口。另外一手。在腹外按定子宮。這時若伸入之手指。向上方探之。當覺有游離的物事。先向上升。並立時復墜於指。這就是胎。

（二）子宮之改變 在第五個月之後。子宮的頸部宿短。甚易察覺。子宮口向後。週圍變鬆。到九個月之後。子宮體和頸部相平。並無界限。

（三）胎兒心跳 孕婦在五個月後。即可聽得胎兒的心跳聲。若兒天天長大。那心跳聲也隨之響亮。那聲音和錶響的聲音類似。但不和母體的脈同數。每分鐘大約有二百二十至百五十至。如有時聽不清楚。那大約是胎兒移位的緣故。不可不知。

（四）別種胎聲 胎兒心聲之外。還有雜音兩種。

A 臍帶跳聲。這原因是血液經過臍帶的血管。發一種單音的呼聲。和胎兒的心跳聲相並。祇限於極小範圍可聽得。若臍帶纏身的胎兒。那比較來得清楚。這聲音在診斷上。很有價值。

B 子宮吹鳴 這是一種特殊的響聲。與吹嘯類似。發聲的原因。一般人多信爲血液穿過子宮動脈。或胎盤的血管所致。和母體之脈。相並而行。但不論子宮因着任何原因而擴大。都有這聲音。所以在診斷上面說起來那未免減色不少。

對於懷孕的徵狀。讀了上面的大意。就可略知其一二了。至於在下寫這段文字的動因。是爲了南洋僑胞李君瓊的要求。要我說明那「神仙難測的瓜內事」。現在同時寫了出來。算是這篇的結論。完了。

◉求孕與避孕初集 再版出書

是解決養兒子問題的一部奇書

演述生理上的種種變化。說明養兒子的一切原理

指示求孕方法！救濟絕嗣痛苦！

凡久婚不孕。年老無子。青年夫婦。人人不可不讀
多子怕育者。本書亦有避免生育之妥善方法

◉每册實售大洋五角 外埠另加寄費九分

上海三馬路雲南路口幸福書局發行

# 長篇專著

## □瘧疾自療法（二） 朱振聲

### □吾妻之患瘧經過

國醫治病。採用王道。治瘧不肯用截法。西藥金雞納霜之風行一時。乃霸道截法之功也。國藥常山。其截瘧之效。不輸於金雞納霜。國醫以其霸而不用。埋沒良才。甚爲可惜。羅君燮元。記述此篇。頌歌常山之功德。並爲之宣傳。深望病家醫家。一體採用。以代金雞納霜。而塞絕大漏巵。—振聲—

蜀漆常山苗也。其性慓悍。服之每多發吐。世每畏服。而醫家亦不敢用。不知此藥截瘧。實有神效。不比他方截瘧。過止一時。而生他患。蓋此藥。能透邪外出。有利無弊。故千金外台多用之。余內年四旬有五。體素弱多病。理家政尤勞。不意於民十六之仲春患瘧。起則畏寒發熱。頭痛自汗。苦渴不渴。嘔吐溲赤。乃用銀翹散加藿香以散之。繼見寒熱便結嘔苦。乃用大柴胡以疏裏。小柴胡以和表。寒熱止而嘔苦不休。又以半夏瀉心以和胃。病退一日而瘧疾又起也。其狀。則裏熱不寒。但甚畏風。一發經二日一夜而熱方衰。但熱未盡而二發又起。惟最甚者。頭痛如劈。左額角翻脈（余曾磁針刺此處。黑血甚多）躍如指粗呻吟月外。耳不忍聞。脈雖浮數。不甚洪大。知是陽明燥氣。夾肝火上衝於腦。振動神筋所致。乃用普濟消毒飲。以清頭目。次以當歸蘆薈丸。以清肝胆。迄不少衰。於是遍嘗涼膈。葛根芩連等湯。加殭蠶蟬蛻荷葉金花。亦如故。後專用大劑白虎。連服七八劑。仍按期而發如前狀。余疑之。乃商於李醫。彼謂其症。雖熱不寒。然又畏風。且嘔清水。苦渴不渴。頭痛如劈。殆乾嘔吐涎沫。頭痛而厥之吳茱萸湯症乎。方用吳萸八錢。洋參二錢。棗四枚。生姜三錢。余頗不謂然。終疑爲陽明燥氣上衝。必非寒逆。然既非寒逆。何以畏風不渴。而吐清水。意必夾飲所致。但既夾有飲。何以用白虎毫尤而不效。余心忐忑無主。被主立用是方。余想有飲。亦可一試。俾全化燥。以便施治。於是暫服頭煎以觀其變。藥進時。而適逢瘧勢將退。一夜安穩。次朝將進二煎。而瘧又發。於是停服煎藥。則見其熱倍常。而大汗頭痛。口渴煩燥諸症。又大作也。至極時。神識頓昏。全家惶恐。余診脈如故。知燥化太過。上衝心腦。一時神筋氣痺。倘得氣還。且喜曾備有大劑白虎煎候。當即頻灌。不一刻而甦。從此不復畏風也。餘症仍前。由是一意白虎加味爲主。症雖累減而瘧終不止。余內屢求止截。始用金雞納霜連服無效。後見局方。謂常山飲。截瘧如神。乃用是方。合千金蜀漆丸。去升麻。獨漆。保用生末。冷服。果一服而瘧吐。其患若失。後用養陰而安。自此凡見有患瘧者。俟數發用方調治後。（無論何種截藥。皆宜先治雜感然後截之。方能生效無弊。）乃按寒熱諸方。加此一味。輒效如神。方知古人立方。良不我欺也。可知此藥截瘧。誠非金雞納霜可比。我國人何不廣爲宣傳。是不但有益病者。而且塞一絕大之漏巵也。（完）

幸福書局代售各種良藥
地址 上海三馬路雲南路轉角

遺精敵
有夢而遺 無夢而洩 久患新起 服之如神
每盒大洋一元

保腦丸
用腦過度 鼻流濁涕 腥臭異常 一服即愈
每盒大洋五角

白濁丸
白濁初起 溺管刺痛 止濁定痛 效如桴鼓
每盒大洋一元

吐血靈丹
肝火犯肺 肺絡損傷 痰紅吐血 服之立止
每盒大洋五角

獺肝定痛散
女子[illegible] 肝病[illegible] 獺肝定痛 靈驗無比
每盒大洋四角



## 寶貴的二張美容奇方 紀效宗

（實用驗方）

### （一）中醫方

此方專治男女面部雀斑。粉刺。黑痣。瘰粒。麻點。疤痕。以及肌膚。粗糙。黯黑。枯黃等症。曾經治愈面病。不下數千。不敢自秘。特錄方中藥名。及用法如下。

（藥名）檀香一錢。甘松一錢。山柰一錢。細辛一錢。藁本一錢。白芷一錢。白蘞一錢。白芨一錢。陀僧一錢。殭蠶一錢。天麻一錢。防風一錢。荊芥一錢。羌活一錢。獨活一錢。山梔一錢。菊花一錢。枯礬一錢。川椒一錢。真珠粉五分。紅棗七枚。

右藥二十一味。共研細末。加蜂蜜四五錢調和。（天氣熱時。可不用蜂蜜。改用溫水調拌亦可）

（用法）每於臨睡時。以手指蘸藥少許。置于兩掌。用力塗擦面部。約數分鐘爲度。該藥至次晨洗去。入夜再依上法擦用。如是試用數星期以上。必有奇效。輕症半料可愈。重症至多用至一二料。急惟心及間斷。不能依法常用者。概難見功。

### （二）西醫方

凡皮膚粗黑。頭髮枯黃。乃爲美容之大障害。欲謀挽救。當以藥品清其血液。增其皮下脂肪。庶可使皮膚細膩白淨。毛髮光澤而烏黑。藥方如下。

亞砒酸○・○五克 黑椒末五・○○克 阿拉比亞樹膠一・○○克 蒸溜水適宜

上藥入器混和。以蒸溜水糊丸。勻作一百粒。每日服三粒。於三餐後開水下。追後漸漸增加。以日服十五粒至三十粒爲限。服至見效爲度。不過此方所用之亞砒酸。含有劇烈之毒性。必經西醫診斷。詢以此方與己體是否合宜可服。若西醫聲明不宜服。萬不可入口。苟得西醫許可。初服時以少爲貴。服過一二星期。絕無變象。方可間一二日加多一粒。又配合時。分量務須穉準。蓋此方爲西洋極貴重之秘方。皮膚粗黑者服之。直有脫胎換骨之效力。惟藥性劇烈而有毒。故宜審慎出之。

## 治血痢經驗良方 李儁頤

血痢是由熱毒內伏腸間。腸管發炎。粘膜破爛。血管之血液溢入肛門而出於大便。又因肺氣不固。收縮乏力。以致屢欲登圊。而下無多。腹中刺痛。口渴舌燥。身體倦怠。此症爲痢之最重。而最惡者。苟治不得法。變症叢生。豈可不慎哉。血痢既屬血管有毒。肺氣不收。則宜涼血解毒。以補血管之傷。兼固肺氣。以助肺臟之力。若血熱已退。則血管堅固。肺氣清肅。則收縮有力。諸症可立愈也。鄙人研究一方。用生地赤芍白芍檳榔藕片知母桃仁涼血退熱。佐大黃山渣。直入大腸。滌除腸垢。加杏仁桔梗。升提肺氣。氣升。則清淨之血液。隨氣以行於血管。濁穢之糟粕。受變化而入於大腸。其大便。即可通順矣。又增木香川楝。行氣止痛。此方歷治多人。皆著奇效。謹列于後。並附加減等法。臨證之時。便可按圖索驥。

治血痢方生地黃五錢。赤白芍各三錢。桃仁二錢。藕肉三錢。檳榔子三錢。知母二錢。山渣肉二錢。大黃四錢。杏仁三錢。桔梗三錢。木香一錢。川楝子三錢。蜜水各一碗。煎八分食前溫服。

如無裏急後重者。去大黃。加秦皮白頭翁各二錢。熱甚口渴者。加石膏一兩。川連二錢。口渴液乾者。加阿膠女貞子各三錢。身熱氣喘者。去桔梗。加石膏一兩。腹內刺痛。裏急後重。一日數十次。所下皆粘滯腸血者。可兼服鄙製痢散丸。最有奇效。但宜隨證按法加減。切勿板方憤事。至爲叮嚀。

□附告上期所刊之「漢醫治肺結核特效之方及醫按一則」因稿未到故暫停

醫藥常識

# 黃疸之病理及治療

葉近仁

夫黃疸者。爲溼熱遏鬱發蒸。浸淫於內。不能從人身排洩于體外。故成爲黃疸。如傷寒論有云。發熱汗出。此爲熱越。不能發黃。但頭汗出而身無汗。身必發黃。是汗既不得從汗線外泄。小便又不利。更渴飲水漿。則內不得從小便洩出。水飲停留。浸無出路。溼熱在裏。勢必發黃•病理上自然之作用也。與西說加答兒性黃疸相似。其說爲胃及十二指腸加答兒之波及。輸胆管加答兒性粘膜腫脹或閉塞或壓迫等之原因。然考其肝與胆之作用。用於人食後。腸胃飽滿。幽門上還輸胆管。使汁液流入十二指腸。以助消化及防腐。若胆汁缺乏或無。則所下之食物精粗不分。糞色白而不黃矣。由是觀之。知其濕熱閉塞肝胆之內。故障礙輸胆管之分泌。若胆液過多。無出路以排洩。則胆汁追從肝之小細管。以及肝小葉內之細胆管。受其壓迫腫脹而發炎。終則輸胆管破裂。而入周圍之淋巴管內。遂自血管流入血內。侵浮全身各部。惟結膜皮膚粘膜發黃特甚。尿呈暗褐色。以發汗利水爲法。仲景以茵陳麻黃湯及茵陳蒿湯主治。蓋麻黃味辛性溫。發太陽之汗。茵陳蒿味苦性寒。專於利水。爲濕熱黃疸要藥。一散一利。甚恰於黃疸病也。而茵陳蒿湯亦以茵陳爲主藥。梔子苦寒清胃腸之血熱。屈曲下行。能降火從小便泄去。大黃苦寒。蕩滌除腸胃之濕熱。溼熱一去。胆汁自有排泄之路。而黃色自退矣。此仲景製方之神妙。可爲後世之明鏡也。

按黃疸症。原由蓄溼而致。濕爲平性。陽臟則化熱。陰臟則化寒。化熱當以茵陳蒿湯。枝子柏皮湯。茵陳五苓爲主治。裏實者。有大黃硝石湯。枝子大黃湯以主之。葉君所論。症屬熱性黃疸。若寒性黃疸。治法又當別論矣。至病理參以西說。亦可藉證。


人生要立身社會謀幸福者？請讀

# 青年之友

方不致誤入歧途

因爲他是男女墮落的救星
因爲他是青年前途的明燈
因爲他是大衆處世的顧問
茲將本書內容要目舉畧如下

青年應有的認識……
希望青年去做切實工作……
青年失業之原因……
給前進的青年……
青年三大要求……
怎樣可免青年的色慾……
青年怎樣去做……
怎樣指正青年的前途……
青年良好習慣……
怎樣救濟失學的青年……
青年居室問題……
怎樣充實自己的能力……
青年戀愛的認識……
怎樣救濟青年心理病態……
青年勿作繭自縛……
青年何嘗如夢……
青年應負的責任……
處世碎錦五十餘則……

全書一册特價祇收大洋二角寄費加一
總發行所上海三馬路雲南路幸福書局
◆◆郵票十足通用◆◆


# 腦膜炎之新舊研究（續）

（李術仁）

中醫則列入瘟疫一門。背謂由於天時寒燠不常。空氣惡濁。釀爲疫癘。或挾寒濕或挾燥風。從口鼻吸入。鬱久則化而爲熱。循脊椎而上入於腦。因發腦膜炎之症。即葉氏所謂溫邪上受。首先犯肺。逆傳心胞。所謂心胞者即腦神經是也。由以上中西醫參各觀之。西醫名腦膜炎者是言其病之所。中醫名溫疫痙者。是言其病之因。各有獨善之長。

乙。治法——西醫對此症無根本治法。惟有脊髓注射血清。或行脊椎穿刺。取水或用冰帽藏頭。使腦熱低降。以殺病菌。間或有效惟少數耳。亦有用碘化銲以阻止其細菌之增殖。皆屬對症治標之療法。而在中醫用藥劑治療。多見特效。大法以解溫毒清血穢。通脈絡鎮神經爲主。又凡患此症者。其小便必不利。故更加利水增液之品。常以此法治現在之腦膜炎症。竟霍然而愈。今將用藥列下；

丙。用藥——在初起如銀翹散葛根湯桑菊飲。皆可隨症加減。再重至發痙期。加羚羊犀角生地丹皮之類。最後至危險期。急救以紫雪丹牛黃丸至寶丹等主劑。隨痙施用。善後清榮扶陰法。又無論前後皆用導赤散參加。以利小便。

丁。預防——預防此症現無相當良法。並乏確切方藥。惟有注意飲食起居。此外對于公共場所。及疫痙流行之地。宜隔離較遠。仍不致傳染。並可行菌苗注射。同時帶口罩。以免空氣傳染。（完）

# 問病須知

（一）本報醫藥顧問欄。近因問病函件。積疊如山。仝人等雖日夜答覆。一時實難清理。對於以後問病函件。不得不另訂新章。以示限制。

（二）今後如定戶欲問病者。本埠須附郵五角。外埠一元。以示限制。空函恕不答覆。非定戶本埠一元。外埠二元。問病者須詳述「男女性別」「何時起病」「經過治療」「現在症狀」方能處方答覆。而不致有誤也。

（三）凡定戶來函問病時。除照章納費外。並須寫明定單號碼。否則。作非定戶論。





病兒須知

# 斜眼之原因

（傅步蘭）

斜眼上視雖非疾症。而其狀態最不雅觀。其原因。則大概小兒自二三歲後至六七歲時。漸知人事。嬉戲好弄。見人怒目斜視。白眼上望。及瞳人逼視內眥。俗所謂鬭雞眼者。皆喜效之。作作不已。則成斜眼矣。其視物必須側首。由外眥角斜睞。而不能迎正面視之也。故父母見其子女效人白眼。宜卽語誡責之。使不得再爲。萬勿因其稚態可愛優容之。蓋小兒知識淺。不能分析是非。如見大人面有喜色。無甚責論。便認爲其爲合理。則必常作以爲歡笑。而其父母此時雖欲禁之弗作。則亦不可得矣。更有一種小兒。因右目便於視。則恒偏用右目。日久習慣。遂專用右目。如欲視左邊之物。則必首左向。或身左轉視之。而左目幾成廢物。左目機關亦漸失其功用。睛珠或自腐壞。是以父母對於以上小兒易犯之症。宜隨時糾正。勿使習慣成症。然而小兒頑皮。每有背乎父母。與要伴相戲以求勝者。故亦應時常留心察視子女之目。如見睛珠有斜視之狀。卽須帶至專科眼醫。爲之察視睛珠。配合光綫。戴副眼鏡。則庶可由光綫將睛球救正之。蓋阮家白眼。雖稱佳話。清臚睥睨。終爲端人。而父母欲求佳子女者。豈可不愼之哉？

# 便秘的原因和治療

（禾人）

也有因其他臟器疾患反射而起的。但此種較腸弛緩不常見而已。

三、便秘的治療

便秘的原因很多。已如上述。治療的方法。有下列三種。

A.日常自行療法

一、注意飲食——每日清晨。飲冷開水。或熱鹽湯一杯。常人每日飲足液汁三磅。臨睡前飲熱開水一杯。飲食應有定時和定量。切莫多食不易消化之物。蔬菜水果。有激腸動之力。均可多吃。麵包饅頭。芋艿蕃茹等物。不可多吃。因有使大便乾燥之虞。

二、練習運動——每日大便。宜有定時。清晨或飯後。爲排便最宜之時。排便前用手揉壓腹部——沿大腸的部位。由腹部右下角起。向上擠至臍平。橫過臍上。向左揉壓。由腹部左上角。擠至右下角。這樣揉壓十分鐘——或使患者平臥。用四五磅重的鐵球。滾轉腹上。也能收效。或於每日早起。運動二三十分鐘。以助腹肌和腸的蠕動。促進排便工作。

B.特別療法

一。托腹法——肥胖之人和孕婦。臟腑下墜。可用托腹帶托之。

二。嬰兒便秘——嬰兒常因乳內脂肪不足。而患便秘。應改換乳母的食品。或服小量的乳脂。

三。灌腸法——此法用者很多。效驗確實。常用者。爲鹹水。溫水。甘油。橄欖油。及他種油類。不過每有習慣的趨向。也是美中不足之處。

四。其他——血虧。痔症。胃肝臟的慢性病。腸扭結。腸捎。子宮向前屈或後傾。以及瘤等。均可依症治療。有煙癖的。可照下藥療法醫治。

C.藥物療法

普通對於便秘。醫家都用藥物治療。然投下劑時。究應與性質如何的下劑。是應考究的問題。原來下劑種類繁多。性形各異。一利一害之事。在所不免。要得到理想的下劑。而確收有益無損之效。實屬難事。

由上看來。不是有特別目的。以不用峻下劑爲安全。若君爲排除腸內容物而用峻下劑時。通便的目的固可速達。但使用後發生不快。例如引起腹痛。裏急後重。或成習慣性者。並加增下劑的分量不可。更可怕的。是藥性猛烈。侵害腸粘膜。所以峻下劑對於便秘。不快之點甚多。

四、下劑的種類

下劑種類。大別爲左列二種。

A.鹽類下劑。鹽類下劑。純係理學作用。若投以適當之量。則腸內容物能維持流動性。而排出水樣大便。可是他的用量甚多。故對於厭惡藥物的。服用時頗感困難。雖無腹痛疝急之弊。但藥味不佳。用量甚大。婦人小兒。不易使用。這不是美中不足嗎？

B.植物性下劑。植物性下劑。一般的均係刺戟腸管。可使蠕動亢進。同時也可增加腸腺的分泌。並易引起腸的充血。故刺戟大腸的藥物。不但引起大腸的充血。也可伴生骨盤內臟器的充血。有時續發月經過多。子宮內出血等。對於妊婦。易惹起流產或早產。這是不可不注意的。（完）